



Виробництво та продаж **насіння**

Портфоліо сортів, які ми пропонуємо на продаж, пройшли багаторічні випробування на базі нашого підприємства і займають в структурі посівних площ:

- Зернова група (пшениця, ячмінь) близько 40 тис. га
- Соя близько 50 тис. га

zahbug.com.ua



Контакти

+38 (050) 372 62 51
zahbug.com.ua

80250, Львівська обл., Шептицький р-н,
с. Павлів, проспект Юності, буд. № 39



Зміст:

Класифікація ґрунтів для посіву сортів 5

Зведена таблиця по сортах 7

Озимий ячмінь

ЗУ Міднайт 8

Озима м'яка пшениця

Інка..... 10

Меган..... 12

Шевін'юн..... 14

ЛГ Оптиміст..... 16

КВС Емерік..... 18

РЖТ Реформ..... 20

КВС Кейтум..... 22

ЗУ Віллем..... 24

Дворучка тверда пшениця

Сенека..... 26

РЖТ Анвергюр..... 28

РЖТ Белалур..... 30

Яра м'яка пшениця

КВС Старлайт..... 32

Контакти 34

Шановні партнери!

Досвід - найцінніше, що у нас є. І саме ним ми ділимося на сторінках цього каталогу, який є результатом наших досліджень та виробничих випробувань за 23 рік роботи компанії.

Фахівці ПП «Західний Буг» постійно працюють над вдосконаленням усіх процесів та технологій, які використовуються в агросфері.

Ми надаємо великого значення підбору сортів та гібридів, тому щорічно висіваємо на випробувальному демонстраційному полігоні:

80 гібридів кукурудзи	40 гібридів ріпаку	100 сортів пшениці	20 сортів ячменю	90 сортів сої
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Це сорти та гібриди ТОП-20 селекційних компаній, посіяні на демонстраційних ділянках згідно методики польового дослідження, що дає змогу об'єктивно оцінити кількісні та якісні характеристики сортів. Отримані результати використовуються для підбору сортів і гібридів у наше портфоліо та індивідуальної адаптації елементів технології вирощування під кожен із них. Цю роботу ми виконуємо для забезпечення отримання гарантованої максимальної врожайності та якості продукції.

Дослідження якості насіння – є багатофакторним. Його вивчення можливе лише в стаціонарних лабораторних умовах. Саме тому, на нашому підприємстві створена сучасна насіннева лабораторія з можливістю оцінити:

- посівні якості насіння,
- наявність ГМО,
- інфікування насіння вірусами,
- наявність насінневих грибних захворювань.

50% потенціалу врожайності сортів залежить від показників якості насіння. Нехтування проведенням потрібних аналізів призводить до гарантованих втрат врожаю та зниження його якості.

Партнери зауважили, що багаторічна робота наших агроспеціалістів дозволяє динамічно збільшувати врожайність с/г культур в сівозміні на 7-10%.

Тому запрошуємо вас до кооперації і плідної співпраці.

Нам довіряють свої сорти оригінатори:



Класифікація ґрунтів для посіву сортів

Клас I.

Землі найвищої якості. Найбільш продуктивні землі - всі типи чорноземів, темно-сірі ґрунти. Володіють потужним гумусовим горизонтом, рівень забезпеченості елементами живлення близький до середнього і вище. Ґрунти придатні для вирощування всіх культур, можна виділити 2-ва підкласи: Ia - урочища на схилах до 3°, немає загрози змиву та замокання; Ib - ті ж ґрунти на схилах 3-5°, є загроза ерозії при вирощуванні просапних культур.

Клас II.

Землі високої якості. Темно-сірі змиті ґрунти, лучні і намиті ґрунти, щебенюваті малорозвинуті чорноземи. Володіють високою продуктивністю, низьким та середнім вмістом елементів живлення, сприятливим рівнем рН, задовільними фізичними властивостями. Придатні для вирощування всіх культур, але по потенціалу поступаються класу I. Доцільно також виділити 2-ва підкласи: IIa - урочища без ризиків змиву та підтоплення, ґрунти слабозмиті; IIb - ті ж ґрунти, але на схилах понад 3° або з ризиками підтоплення, ґрунти вже на даний час змиті.

Клас III.

Землі середньої якості. Світло-сірі та сірі ґрунти, дернові ґрунти та чорноземи карбонатні. В цілому продуктивні ґрунти з відхиленням від оптимального рівня рН в ту чи іншу сторону. Мають високий потенціал тільки за сприятливих погодних умов та меліорації. Обмежено придатні під цукрові буряки, озимий ячмінь, сою та інші культури з високими вимогами до властивостей ґрунту. Профіль ґрунтів укорочений, водно-фізичні властивості неоптимальні. Доцільно виділити 2-ва підкласи, але за іншим принципом: IIIa - урочища з домінацією кислих ґрунтових відмін (сірі та світло-сірі) - основний лімітуючий фактор є рН; IIIb - урочища з домінацією чорноземів карбонатних - вологодефіцитні, щебенюваті, з рН понад 7,2.


Клас IV.

Землі низької якості. Низькопродуктивні дерново-підзолисті та торфово-болотні ґрунти. Характеризуються несприятливими агрохімічними та водно-фізичними властивостями, непридатні для цукрових буряків, зернобобових та озимого ячменю. Доцільно виділити 2-ва підкласи: IVa - незамокаючі дерново-карбонатні та дерново-підзолисті ґрунти; IVb - стабільно замокаючі болотні та торфові ґрунти.

Клас V.

Низькопродуктивні землі. Всі піщані ґрунти, сильнокислі глееві ґрунти, виходи порід та сильноеродовані ґрунти. Фактично в чистому вигляді таких урочищ немає. Придатні тільки під ріпаково-зернову сівозміну, використання під луки або вилучення з обробітку.

Зональність придатності вирощування сортів



Зона	Ячмінь озимий	Пшениця м'яка озима	Пшениця м'яка яра	Пшениця тверда
Зона 1	ЗУ Міднайт	Інка, Меган, ЛГ Оптиміст, Шевін'йон	КВС Старлайт	Сенека, РЖТ Анвергюр, РЖТ Белалур
Зона 2	ЗУ Міднайт	Інка, Меган, ЛГ Оптиміст, Шевін'йон, КВС Кейтум, РЖТ Реформ, КВС Емерік, ЗУ Віллем	КВС Старлайт	Сенека, РЖТ Анвергюр, РЖТ Белалур
Зона 3	ЗУ Міднайт	Інка, Меган, ЛГ Оптиміст, Шевін'йон, РЖТ Реформ, КВС Емерік, ЗУ Віллем	КВС Старлайт	Сенека, РЖТ Анвергюр, РЖТ Белалур

Рекомендований баланс посіву сортів озимої м'якої пшениці для забезпечення якості та валу

Група якості	Сорти
Е (20%)	КВС Емерік, Понтіформ
А/В (70%)	ЛГ Оптиміст, РЖТ Реформ, ЗУ Віллем, Шевін'йон, Інка, Меган
С (10%)	КВС Кейтум

Конвеєрність збирання



Зведена таблиця по сортах

Озимий ячмінь	1 - ранній, 9 - пізній		1 - низька, 9 - висока					1 - не схильний, 9 - схильний						
	Цвітіння	Група стиглості	Густота	Озерненість	Маса 1000 насінин	Висота рослини	Виллягання	Ламкість стебла	Ламкість колоса	Борошниста роса	Сітчаста плямистість	Ринхоспоріоз	Рамуляріоз	Карликова іржа
ЗУ Міднайт	4	5	4	6	6	6	5	6	5	3	5	7	5	4

не схильнийсхильний

Пшениця м'яка озима	1 - ранній, 9 - пізній			1 - низька, 9 - висока					1 - не схильний, 9 - схильний								
	Цвітіння	Група стиглості	Група якості	Блок	Густота	Озерненість	Маса 1000 насінин	Висота рослини	Виллягання	Церкоспорель озна гниль	Борошниста роса	Септоріоз	Піренофороз	Жовта іржа	Бура іржа	Фузаріоз	
	Інка	4	3	A	4	5	5	6	4	4	3	5	4	5	2	4	5
	Меган	4	3	A	4	5	5	5	4	5	3	4	4	4	2	4	5
	Шевін'йон	4	4	B	3	5	7	5	4	5	5	4	4	5	2	4	5
	ЛГ Оптиміст	4	4	A	3	5	5	6	4	7	3	6	4	5	2	2	4
	КВС Емерік	5	5	E	7	4	5	7	5	4	5	3	4	5	2	4	4
	РЖТ Реформ	6	5	A	4	6	4	5	3	4	5	3	5	6	4	3	4
	КВС Донован	5	5	A	4	5	5	5	5	4	3	5	4	5	4	8	5
	КВС Кейтум	5	5	C	1	5	5	7	5	6	5	2	4	5	3	4	4
ЗУ Віллем	5	6	A	3	4	5	7	5	7	5	2	4	6	4	5	6	
низька			висока					не схильний							схильний		

Пшениця тверда	1 - ранній, 9 - пізній		1 - низька, 9 - висока					1 - не схильний, 9 - схильний				
	Цвітіння	Група стиглості	Блок	Густота	Озерненість	Маса 1000 насінин	Висота рослини	Виллягання	Борошниста роса	Септоріоз	Жовта іржа	Фузаріоз
Сенека	4	3	4	5	5	6	4	4	4	4	3	5
РЖТ Анвергюр	5	4	4	5	6	5	3	4	4	3	4	5
РЖТ Белалур	5	6	5	5	7	5	4	5	3	4	4	5

низькависока

не схильнийсхильний

Пшениця м'яка яра	1 - ранній, 9 - пізній		Група якості	Білок	1 - низька, 9 - висока				1 - не схильний, 9 - схильний					
	Цвітіння	Група стиглості			Густота	Озерненість	Маса 1000 насінин	Висота рослини	Виллягання	Борошніста роса	Септоріоз	Жовта іржа	Бура іржа	Фузаріоз
КВС Старлайт	6	6	A	6	6	6	5	6	5	6	4	3	4	4

не схильнийсхильний

Фуражний озимий ячмінь

3У Міднайт

Ранній високоврожайний сорт з чудовою адаптивною здатністю

Оригінатор: **Saaten Union (Німеччина)**

Рік реєстрації: **2023**

Різновид: **шестирядний**

Група якості: **фуражний**

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній

Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній

Висота рослини

1 - низька, 9 - висока

Вилягання

1 - не схильний, 9 - схильний

Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний

Ламкість стебла

1 - не схильний, 9 - схильний

Ламкість колоса

1 - не схильний, 9 - схильний

Густота

1 - низька, 9 - висока

Озерненість

1 - низька, 9 - висока

Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Борошниста роса

Сітчаста плямистість

Ринхоспоріоз

Рамуляріоз

Карликова іржа



Високоврожайний сорт, який формує врожай за рахунок високої маси тисячі насінин та високої озерненості колоса



Поеднує високу стабільну урожайність і хорошу якість зерна



Має високу стійкість до хвороб та подвійну резистентність до вірусу жовтої мозаїки ячменю



Підходить для всіх типів ґрунтів та попередників

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	12.09 - 20.09	230 - 260	250 - 280	230 - 260
Оптимальний	21.09 - 30.09	260 - 300	280 - 320	260 - 300
Пізній	01.10 - 05.10	300 - 330	320 - 350	300 - 330
Цільові густоти		500 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Початок вегетації (ВВСН 13 - 25) з урахуванням Nmin:				
2 - 3 пагона		40 - 60	50 - 60	50 - 60
3 - 6 пагонів, з ознаками пожовтіння		40 - 60	60 - 70	40 - 50
4 - 6 пагонів без ознак пожовтіння		30 - 50	40 - 60	30 - 40
ВВСН 31		60 - 80		
ВВСН 45		30 - 40		

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку	1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5	
ОДНОРАЗОВА ЗА НИЗЬКОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ				
ВВСН 32 - 39	0,4 - 0,7 Моддус		0,3 - 0,6 Моддус	
БАГАТОРАЗОВА ЗА ВИСОКОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ				
ВВСН 32	0,3 - 0,6 Моддус			
ВВСН 39 - 49	0,2 - 0,4 Церон			

М'яка озима пшениця

ІНКА

Ультраранній сорт для раннього старту жнив.
Оригінатор: **Oseva (Чехія)**
Рік реєстрації: **2025**
Різновид: **лютесценс (безоста)**
Сортотип: **колосовий**
Група якості: **цінна**
Класифікація якості: **А (якісна)**

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній

Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній

Висота рослини

1 - низька, 9 - висока

Вилігання

1 - не схильний, 9 - схильний

Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний

Густота

1 - низька, 9 - висока

Озерненість

1 - низька, 9 - висока

Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока

Білок

1 - низький, 9 - високий

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Церкоспорельозна гниль

Борошниста роса

Септоріоз

Піренофороз

Жовта іржа

Бура іржа

Фузаріоз



Інтенсивна осіння активність і ранній початок вегетації навесні



Високий потенціал кущення.



Висока стійкість до основних хвороб



Висока стійкість до вилігання

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.09 - 25.09	250 - 280	290 - 320	250 - 280
Оптимальний	26.10 - 15.10	280 - 350	300 - 350	280 - 350
Оптимальний, ближче до пізнього	15.10 - 25.10	340 - 380	350 - 400	350 - 380
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13 - 29: 1 - 3 листка		55	70	50
ВВСН 30		70	75	70
ВВСН 37		45	40	60

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
		двократна регуляція		
ВВСН 25 - 29		1 - 1,2 CCC		
ВВСН 31 - 32		0,3 - 0,5 CCC + 0,25 -0,4 Моддус		

М'яка озима пшениця

МЕГАН

Ультраранній сорт для раннього старту жнив.
Оригінатор: **Oseva (Чехія)**
Рік реєстрації: **2022**
Різновид: **лютесценс (безоста)**
Сортотип: **колосовий**
Група якості: **цінна**
Класифікація якості: **А (якісна)**

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній

Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній

Висота рослини

1 - низька, 9 - висока

Виягання

1 - не схильний, 9 - схильний

Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний

Густота

1 - низька, 9 - висока

Озерненість

1 - низька, 9 - висока

Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока

Білок

1 - низький, 9 - високий

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Церкоспорельозна гниль

Борошниста роса

Септоріоз

Піренофороз

Жовта іржа

Бура іржа

Фузаріоз

- Інтенсивна осіння активність і ранній початок вегетації навесні
- Висока стійкість до основних хвороб
- Висока стійкість до вилягання

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.09 - 25.09	250 - 280	290 - 320	250 - 280
Оптимальний	26.10 - 15.10	280 - 350	300 - 350	280 - 350
Оптимальний, ближче до пізнього	15.10 - 25.10	340 - 380	350 - 400	350 - 380
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13 - 29: 1 - 3 листка		55	70	50
ВВСН 30		40	75	70
ВВСН 37		45	40	60

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
двократна регуляція				
ВВСН 25 - 29		1 - 1,2 CCC		
ВВСН 31 - 32		0,3 - 0,5 CCC + 0,25 - 0,4 Моддус		

12

13

М'яка озима пшениця

ШЕВІНЬЙОН

Сорт №1 в Німеччині завдяки високій врожайності і стабільності протягом останніх 3-х років. 2025р. - це початок історії розвитку цього сорту в Україні.

Оригінатор: **Saaten Union (Німеччина)**

Рік реєстрації: **2024**

Різновид: **лютесценс (безоста)**

Сортотип: **компенсаційний**

Група якості: **фуражна**

Класифікація якості: **В (фуражна)**

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній

Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній

Висота рослини

1 - низька, 9 - висока

Вилигання

1 - не схильний, 9 - схильний

Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний

Густота

1 - низька, 9 - висока

Озерненість

1 - низька, 9 - висока

Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока

Білок

1 - низький, 9 - високий

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Церкоспорельозна гниль

Борошниста роса

Септоріоз

Піренофороз

Жовта іржа

Бура іржа

Фузаріоз



Ранній сорт із високою стабільністю врожаю, який поєднує добру зимостійкість, посухостійкість та комплексну стійкість до основних хвороб



Завдяки високій пластичності та стабільній продуктивності сорт придатний для вирощування в широкому діапазоні ґрунтово-кліматичних умов, включаючи зони ризикованого землеробства та господарства з пізніми строками сівби



Висока стійкість до вилигання

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
Термін посіву		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.09 - 25.09	260 - 280		
Оптимальний	26.10 - 15.10	280 - 330		
Оптимальний, ближче до пізнього	16.10 - 05.11	340 - 380		
Цільові густоти		600 - 650	550 - 600	500 - 600

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) BVCH 13/25:				
1 - 3 листка		50 - 60		
Початок кущення		50 - 60		50
2 - 3 сильних пагони		50		
3 - 5 сильних пагонів		40 - 50		
BVCH 31 - 32		50 - 60		
BVCH 37 - 39		40 - 50		

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
		двократна регуляція		
BVCH 25 - 29		1 - 1,2 CCC		
BVCH 31 - 32		0,2 - 0,4 CCC + 0,2 Моддус		

М'яка озима пшениця

ЛГ ОПТИМІСТ

ТОП сорт Німеччини завдяки високій урожайності і відмінній стійкості до хвороб вже доступний в Україні

Оригінатор: Limagrain (Франція)


Рік реєстрації: 2025

Різновид: лютесценс (безоста)

Сортотип: компенсаційний

Група якості: цінна

Класифікація якості: А (якісна)



СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний



Генетична стійкість до ламкості стебла



Високоврожайний сорт з високими показниками якості



Висока толерантність до фузаріозу колоса



Пластичний до термінів посіву



Висока зимостійкість

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.09 - 25.09	250 - 280	290 - 320	250 - 280
Оптимальний	26.09 - 15.10	280 - 350	300 - 350	280 - 350
Оптимальний, ближче до пізнього	16.10 - 30.10	340 - 380	350 - 400	350 - 380
Пізній	01.11 - 10.11	400	450	400
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13 - 29:				
1 - 3 листка		55	70	50
ВВСН 30		70	75	70
ВВСН 37		45	40	60

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
двократна регуляція				
ВВСН 25 - 29		1 - 1,2 CCC		
ВВСН 31 - 32		0,3 - 0,5 CCC + 0,25 - 0,4 Моддус		

М'яка озима пшениця

KBC Емерік

Найкращий вибір сорту для хлібопекарських цілей

Оригінатор: KWS (Німеччина)

Рік реєстрації: 2021

Різновид: лютесценс (безоста)

Сортотип: колосовий

Група якості: сильна

Класифікація якості: Е (Елітна)

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній



Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній




Висота рослини

1 - низька, 9 - висока



Вилягання

1 - не схильний, 9 - схильний



Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний



Густота

1 - низька, 9 - висока



Озерненість

1 - низька, 9 - висока



Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока



Білок

1 - низький, 9 - високий




СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Церкоспорельозна гниль



Борошниста роса



Септоріоз



Піренофороз



Жовта іржа



Бура іржа



Фузаріоз



Високоврожайний сорт, який формує врожайність за рахунок високої маси 1000 насінин



Дуже високий вміст білка та відмінні хлібопекарські властивості



Невибагливий до різних типів ґрунтів, термінів посіву



Високоєфективне засвоєння азоту

Норми висіву, шт/м²

Термін посіву		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.09 - 25.09	260 - 290		260 - 280
Ранній, ближче до оптимального	26.09 - 05.10	290 - 320		280 - 310
Оптимальний	06.10 - 15.10	320 - 340		310 - 330
Оптимальний, ближче до пізнього	16.10 - 31.10	340 - 400		330 - 390
Пізній	01.11 - 10.11	400 - 440		390 - 430
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га

Фаза розвитку		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13/25:				
1 - 3 листка		40 - 60	50 - 60	
Початок кущення		50 - 60	50 - 60	
2 - 3 сильних пагони		50	50	
3 - 5 сильних пагонів		40 - 50	40 - 50	
ВВСН 30 - 32		90 - 100		70 - 80
ВВСН 37 - 39		-		

Ріст регуляція, л/га

Фаза розвитку		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
ДВОКРАТНА РЕГУЛЯЦІЯ				
ВВСН 25 - 29		0,75 - 1 ССС		
ВВСН 30 - 31		0,2 - 0,3 ССС		

М'яка озима пшениця

РЖТ РЕФОРМ

Сорт, який займає ТОП позиції в посівах озимої пшениці Європи і України.

Оригінатор: RAGT Semences (Франція)


Рік реєстрації: 2017

Різновид: лютесценс (безоста)

Сортотип: компенсаційний


Група якості: цінна

Класифікація якості: А (Якісна)



СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний



Високоврожайний сорт із стабільними показниками якості (натура, число падіння)



Стійкий до борошнистої роси, септоріозу, фузаріозу та іржі



Середньо-пізні терміни досягання



Не вимогливий до ґрунтів, термінів посіву та попередників

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Термін посіву	Ранній	220 - 250		210 - 240
	Ранній, ближче до оптимального	260 - 290		250 - 280
	Оптимальний	300 - 340		290 - 330
	Оптимальний, ближче до пізнього	350 - 390		340 - 380
	Пізній	400		390
Цільові густоти		550 - 600	500 - 600	500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку	1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5	
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13/25:				
1 - 3 листка	60 - 70	50 - 60	60 - 70	
Початок кущення				
2 - 3 сильних пагони				
3 - 5 сильних пагонів				
ВВСН 31 - 32	60 - 70			
ВВСН 37 - 39	60			
ВВСН 55 - 59	40	30		

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Фаза розвитку		ДВОКРАТНА РЕГУЛЯЦІЯ		
ВВСН 25 - 29		1 CCC		0,75 CCC
ВВСН 31		0,3 Моддус + 0,3 CCC		0,25 Моддус + 0,3 CCC

М'яка озима пшениця

КВС КЕЙТУМ

Найновіший сорт з найвищим потенціалом врожайності у нашому портфоліо

Оригінатор: KWS (Німеччина)

Рік реєстрації: 2022

Різновид: лютесценс (безоста)

Сортотип: колосовий

Група якості: фуражна

Класифікація якості: С (фуражна)

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній

Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній

Висота рослини

1 - низька, 9 - висока

Вилягання

1 - не схильний, 9 - схильний

Вимерзання

1 - не схильний, 9 - схильний

Густота

1 - низька, 9 - висока

Озерненість

1 - низька, 9 - висока

Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока

Білок

1 - низький, 9 - високий

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Церкоспорельозна гниль

Борошниста роса

Септоріоз

Піренофороз

Жовта іржа

Бура іржа

Фузаріоз



Інтенсивна осіння активність і ранній початок вегетації навесні.



Високий потенціал кущення.



Пізні строки сівби.



Придатний до вирощування в монокультурі.

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній Оптимальний Оптимальний, ближче до пізнього Пізній	26.09 - 05.10	290 - 320	280 - 310	
	06.10 - 15.10	320 - 340	310 - 330	
	16.10 - 31.10	340 - 400	330 - 390	
	01.11 - 05.11	420	410	
Цільові густоти		550 - 600	500 - 550	

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) BVCH 13/25:				
1 - 3 листка		50 - 60		
Початок кущення		50 - 60		50
2 - 3 сильних пагони		50		
3 - 5 сильних пагонів		40 - 50		
BVCH 31 - 32		50 - 60		
BVCH 37 - 39		40 - 50		

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
		ДВОКРАТНА РЕГУЛЯЦІЯ		
BVCH 25 - 29		0,8 - 1,2 CCC		
BVCH 31 - 32 або		0,3 - 0,6 CCC 0,8 - 1,1 CCC + 0,4 - 0,6 Моддус		

М'яка озима пшениця

ЗУ ВІЛЕМ

Новий високопродуктивний сорт, придатний до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування

Оригінатор: Saaten Union (Німеччина)

Рік реєстрації: 2023

Різновид: лютесценс (безоста)

Сортотип: колосовий


Група якості: цінна

Класифікація якості: А (Якісна)



СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний



- Високоврожайний, стійкий до хвороб
- Колосового типу з високою масою 1000 насінин
- Середньопізній А-сорт з високим числом падіння
- Дуже швидкий осінній розвиток
- Висока стійкість до хвороб листя
- Висока екологічна пристосованість

Термін посіву		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	20.09 - 30.09	240 - 270		
Оптимальний	01.10 - 25.10	270 - 310		
Пізній	до 15.11	350 - 400		
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Фаза розвитку		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13/25:		60 - 70		
ВВСН 30 - 31		70 - 90		
ВВСН 47 - 51		80 - 90		

Фаза розвитку		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
ДВОКРАТНА РЕГУЛЯЦІЯ				
ВВСН 25 - 29		0,5-1 л CCC		
ВВСН 30 - 31		0,2-0,3 л CCC	0,2-0,4 л CCC	

Тведа пшениця яра

СЕНЕКА

Сорт № 1 і стандарт якості Італії, а також лідер з виробництва макаронів та крупи!

Оригінатор: APSOV (Італія)

Рік реєстрації: 2025

Різновид: Ерітроспермум (остистий)

Сортотип: колосовий

Група якості: Сильна Е

Цвітіння

1 - ранній, 9 - пізній



Група стиглості

1 - ранній, 9 - пізній



Висота рослини

1 - низька, 9 - висока



Виягання

1 - не схильний, 9 - схильний



Густота

1 - низька, 9 - висока



Озерненість

1 - низька, 9 - висока



Маса 1000 насінин

1 - низька, 9 - висока



Білок

1 - низький, 9 - високий



СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний

Борошниста роса



Септоріоз



Жовта іржа



Фузаріоз



Сорт генетично орієнтований на формування дуже великого, щільного, добре озерненого головного колоса з високою масою тисячі насінин



Поеднує високий потенціал урожайності з посухостійкістю, що гарантує стабільно високі результати навіть за умов дефіциту вологи



Дуже високий індекс жовтого кольору й чудові параметри якості зерна гарантують найкращу якість крупи та макаронів



Потужний потенціал урожайності та висока толерантність до хвороб гарантують високий і стабільний результат урожайності в зоні достатнього та середнього зволоження

Норми висіву, шт/м²

Термін посіву		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.10 - 31.10	360 - 380	340 - 360	340 - 360
Оптимальний (осінь)	1.11 - 15.11	400 - 420	380 - 400	360 - 380
Оптимальний (весна)	20.02 - 28.02	370 - 390	370 - 390	370 - 390
Пізній	1.03 - 15.03	420		410
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га

Фаза розвитку	Тип ґрунту		
	1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13/25:	50 - 70		
ВВСН 29 - 32	40 - 60		
ВВСН 49 - 51	50 - 80		

Тведа пшениця дворучка

РЖТ АНВЕРГЮР

Сорт № 1 і стандарт якості Франції, а також лідер з виробництва макаронів та крупи!

Оригінатор: RAGT (Франція)

Рік реєстрації: 2024

Різновид: Ерітроспермум (остистий)


Сортотип: колосовий

Група якості: Сильна Е



СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ:

1 - не схильний, 9 - схильний



Сорт компенсаторного типу формування урожайності з високою якістю зерна, визнаний найбільшими у Європі виробниками макаронів та крупи — Barilla і Panzani!



Поеднує високий потенціал урожайності з посухостійкістю, що гарантує стабільно високі результати навіть за умов дефіциту вологи



Дуже високий індекс жовтого кольору й чудові параметри якості зерна гарантують найкращу якість



Чудове поєднання групи стиглості, гнучкості у строках сівби та адаптивності до всіх умов вирощування в Україні

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.10 - 31.10	360 - 380	340 - 360	340 - 360
Оптимальний (осінь)	1.11 - 15.11	400 - 420	380 - 400	360 - 380
Оптимальний (весна)	20.02 - 28.02	370 - 390	370 - 390	370 - 390
Пізній	1.03 - 15.03	420		410
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) BVCH 13/25:		50 - 70		
BVCH 29 - 32		40 - 60		
BVCH 49 - 51		50 - 80		

Тведа пшениця дворучка

РЖТ БЕЛАЛУР

Сорт з високим потенціалом врожайності та стікість до хвороб, який ідеально підійде для макаронної промисловості

Оригінатор: RAGT (Франція)

Рік реєстрації: 2024

Різновид: Ерітроспермум (остистий)

Сортотип: колосовий

Група якості: Сильна Е



- Сорт колосового типу формування урожайності з високою якістю зерна, визнаний усіма виробниками макаронів та крупи у Франції
- Потужний потенціал урожайності та висока толерантність до хвороб гарантують високий і стабільний результат урожайності в зоні достатнього та середнього зволоження
- Дуже високий індекс жовтого кольору й чудові параметри якості зерна гарантують найкращу якість крупи та макаронів
- Стійкість до вилигання в поєднанні із середньопізньою групою стиглості допоможуть розкрити потенціал вашого поля!
- Висока маса тисячі насінин, чудова натура, вміст білка та виняткова склоподібність гарантують високу якість зерна

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	15.10 - 31.10	360 - 380	340 - 360	340 - 360
Оптимальний (осінь)	1.11 - 15.11	400 - 420	380 - 400	360 - 380
Оптимальний (весна)	20.02 - 28.02	370 - 390	370 - 390	370 - 390
Пізній	1.03 - 15.03	420		410
Цільові густоти		550 - 600		500 - 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Фаза розвитку				
Відновлення вегетації, включаючи Nmin (0-30) ВВСН 13/25:		50 - 70		
ВВСН 29 - 32		40 - 60		
ВВСН 49 - 51		50 - 80		

М'яка яра пшениця

KBC Старлайт

Оригінатор: KWS (Німеччина)


Рік реєстрації: 2020

Різновид: лютеценс (безоста)

Сортотип: колосовий

Група якості: цінна

Класифікація якості: А (Якісна)



Високоврожайний сорт, який формує врожайність за рахунок доброї озерненості колоса



Висока стійкість до листових хвороб та хвороб колоса




Забезпечує стабільну врожайність

Норми висіву, шт/м²		Тип ґрунту		
Термін посіву		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Ранній	25.02 – 05.03	370 – 400		
Оптимальний	06.03 – 25.03	400 – 450		
Пізній	26.03 – 10.04	450 – 500		
Цільові густоти		550 – 650	550 – 650	500 – 550

Азотне живлення, кг д.р./га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
Під посів, включаючи Nmin		70 – 80		
ВВСН 31 – 32		60 – 80		
ВВСН 37 – 39		-		
ВВСН 47 – 51		60 – 70		

Ріст регуляція, л/га		Тип ґрунту		
Фаза розвитку		1А, 1Б, 2А	2Б, 3А	3Б, 4А, 4Б, 5
ВВСН 29		0,5 – 0,75 CCC		

Контакти



Назар Васевич

Львівська, Тернопільська,
Волинська, Рівненська область

+ 38 050 377 47 62

nazar.vasevich@zahbug.com.ua

Альбіна Мацюк

Житомирська, Вінницька,
Хмельницька, Київська область

+38 050 307 23 81

albina.matsiuk@zahbug.com.ua

Олександр Замойський

Львівська, Тернопільська,
Івано-Франківська, Хмельницька,
Чернівецька області

+ 38 067 329 03 73

oleksandr.zamojskij@zahbug.com.ua

Галина Бабій

інші регіони

+38 050 256 07 29

galina.babii@zahbug.com.ua